

SINDROME DE DARIER-WHITE

A doença de Darier é um transtorno genético raro, de caráter autossômico recessivo caracterizado por presença de crostas escuras. A doença foi descrita pelo médico francês Ferdinand-Jean Darier.

As erupções cutâneas são persistentes, de forma irregular, de textura áspera, geralmente de coloração amarela ou acastanhada. As regiões do corpo mais afetadas são pescoço, costa, orelhas, testa e virilha, no entanto pode afetar outras partes do corpo. As lesões cutâneas com frequência tornam-se infectadas, com mau cheiro e provoca muito desconforto. A gravidade da doença é variável.

Além disso, pode haver engrossamento da planta dos pés e da palma das mãos. Pode surgir pápulas (edema) na boca, esôfago, vagina, vulva e reto. As unhas tornam-se frágeis. A exposição ao sol, calor, umidade e estresse pode agravar as erupções cutâneas.

Afeta ambos os sexos, inicia-se em torno dos 30 anos. A prevalência mundial desta desordem é desconhecida, estima-se 1 em 100.000 indivíduos.



05/05/2013



27/5/2013



15/10/2013



A sequência de fotos mostra a evolução do tratamento com a involução das lesões provocadas por esta síndrome. Lembrando que a pessoa ainda continua sob observação e em evolução com resultado favorável até esta data;

O tratamento foi feito com técnica do BodyTalk System e sem uso de medicamentos.

Londrina (PR), 5 novembro de 2013

IMPORTANTE

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM **BODYTALK** PARA ESCLARECIMENTO.

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.

Dr. Luiz Carlos Bertoni